

ЮНИЛАК-16 – качественный заменитель цельного молока европейского уровня на основе молочных компонентов. **ЮНИЛАК-16** содержит 22 % протеина и 16 % жира, не менее 40 % лактозы в составе углеводов, обогащен витаминами и минералами и отлично подходит для выпойки телят с 7 дня жизни.

Состав: сывороточно-жировой концентрат с пальмово-кокосовым маслом, сыворотка подсырная, витаминно-минеральный премикс, органические кислоты, пробиотики и пребиотики.

Питательность:

Протеин сырой, не менее	22,0 %
Жир сырой, не менее	16,0 %
Углеводы, не менее	47,5 %
в том числе Лактоза	40,0 %
Клетчатка сырая, не более	0,5 %
Зольный остаток, не более	9,0 %
Влага, не более	5,0 %

Макроэлементы, не менее

Ca (кальций)	1,2 %
P (фосфор)	0,8 %
Na (натрий)	0,6 %
K (калий)	1,9 %

Микроэлементы, не менее

Fe (железо)	1020 мг/кг
Cu (медь)	90 мг/кг
Mn (марганец)	100 мг/кг
Se (селен)	5 мг/кг
Zn (цинк)	1450 мг/кг
Co (кобальт)	2 мг/кг

Витамины, не менее

Витамин А	5 500 МЕ
Витамин Д3	4 500 МЕ
Витамин Е	800 мг/кг
Витамин В 1	160 мг/кг
Витамин В 2	140 мг/кг
Витамин В 3	360 мг/кг
Витамин В 5	500 мг/кг
Витамин В 6	80 мг/кг
Витамин В 7	5 мг/кг
Витамин В 12	1 мг/кг
Витамин К 3	80 мг/кг
Витамин С	1200 мг/кг

Аминокислоты, не менее

Лизин	1,57 %
Метионин	0,37 %
Метионин + цистин	0,72 %
Треонин	1,03 %
Триптофан	0,30 %

Рекомендации по приготовлению:

Возьмите примерно половину (4 л) необходимого количества чистой воды с температурой 50-55°C. Постепенно добавляйте 1 кг ЗЦМ и хорошо размешайте до получения однородной смеси. Добавьте чистую теплую воду до необходимого количества жидкого ЗЦМ (8-9 л). Немедленно выпаивайте телятам, пока смесь сохраняет температуру 38-40°C.

Следите за чистотой оборудования. Закрывайте мешок и мойте посуду после использования. Соблюдайте схему кормления и часы раздачи корма. Периодически необходимо делать анализ качества питьевой воды.

Упаковка: многослойный бумажный мешок с полиэтиленовым вкладышем

Срок годности: 9 мес. с даты производства (см. на упаковке).

Схема выпойки телят

Возраст молодняка	Кратность выпойки молочных кормов
1-2 день	1,5 – 2 литра молозива 3-4 раза в день
3-6 день	2 литра молозива 3 раза в день
7-8 день	2 раза в день по 3 л (50% коровье молоко 50% Юнилак 16)
9-10 день	2 раза в день по 3 л (30% коровье молоко 70% Юнилак 16)
3-4 неделя	2 раза в день по 3 л Юнилак 16
5-8 неделя	2 раза в день по 2,5 л Юнилак 16
9 неделя	2 раза в день по 2, л Юнилак 16
Далее	2 раза в день по 1,5 л Юнилак 16